


Qu'est-ce que cela signifie pour les gays ?

Un gay sur six dans le milieu est séropositif.

Voilà pourquoi le risque d'infection lors de rapports sexuels non protégés est nettement plus élevé chez les gays que chez les hétérosexuels.

Des partenaires sexuels de confiance peuvent, eux aussi, être très infectieux s'ils viennent de s'infecter et ne le savent pas encore.

Les rapports sexuels non protégés pendant la primo-infection sont le moteur de l'épidémie du VIH chez les gays !



Pouvons-nous faire quelque chose ?

Oui! Si tous les gays pratiquent en même temps et pendant 3 mois consécutifs le safer sex.

Ainsi, plus aucune transmission du VIH ne se fera, et la chaîne de nouvelles infections pendant la phase de primo-infection sera rompue.

Mais cela ne marche que si toi, tes amis et toute la communauté gay jouent le jeu.

Alors, participe à l'action de l'Aide suisse contre le sida lorsque elle sera lancée ! Tu le sauras grâce aux annonces dans la presse gay et aux infos sur Internet.

Pour plus d'infos : www.drgay.ch



Tout ce qu'il faut savoir sur la


primo-infection



C'est quoi, une primo-infection ?

La primo-infection, c'est la première phase d'une infection au VIH.

Quelques jours après l'infection déjà, le virus se propage dans tout le corps. Ce n'est que 6 à 8 semaines plus tard que la charge virale baisse lorsque le système immunitaire commence sa production d'anticorps.



Pourquoi cette information est importante ?

Parce qu'une personne nouvellement infectée est très infectieuse à cause de la quantité élevée de virus dans le sang et le sperme.

Pendant cette phase, beaucoup ne savent pas encore qu'ils sont infectés et transmettent le virus sans le savoir.



Près de la moitié des gays séropositifs se sont infectés avec un partenaire qui était lui-même en phase de primo-infection.

Edité par l'Aide Suisse contre le Sida
Réalisation: Thomas Bucher, schloss-ludwig.ch, Life Science Communication
Avec le soutien de l'office fédéral de la santé publique
Traduction : www.weiss-traductions.ch, Vincent Jobin, Richard Zahno, Steven Derendinger

Comment reconnaître une primo-infection ?

Souvent, on observe des symptômes ressemblant à une grippe au cours des premières semaines. Ces symptômes disparaissent spontanément.

Seul un test VIH peut permettre de savoir si l'on est séropositif ou non.

Dans les 72h suivant la prise de risque, rends-toi immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche, de jour comme de nuit, pour demander une PEP (prophylaxie post-exposition). Après une situation à risques, au lieu d'attendre, demande immédiatement conseil!

Tu trouveras sur le site www.aids.ch une liste des services d'urgence et des centres de dépistage sous la rubrique Adresses, liens.

Ou adresse toi au checkpoint à Genève:
www.checkpoint-ge.ch